

CUADRO GENERAL PARA LA DISPENSACIÓN DE SALES DE HIERRO POR VÍA ORAL

ESPECIALIDADES	COMPOSICIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADVERTENCIAS	PRECAUCIÓN
FERROPROTINA	Ferrimanitol ovoalbúmina (Fe+++) Contiene 20-40-80 mg Fe/sobre	Después de las comidas	Contiene lactosa y sacarosa Ennegrece heces y dientes	Diabéticos, ancianos, ulcerosos Intolerantes a lactosa, problemas GI
KILOR	Ferrimanitol ovoalbúmina (Fe+++) Contiene 40-80 mg Fe/sobre	Después de las comidas	Contiene lactosa y sacarosa Ennegrece heces y dientes	Diabéticos, ancianos, ulcerosos Intolerantes a lactosa, problemas GI
PROFER	Ferrimanitol ovoalbúmina (Fe+++) Contiene 40-80 mg Fe/sobre o compr	Después de las comidas	Contiene lactosa y sacarosa Ennegrece heces y dientes	Diabéticos, ancianos, ulcerosos Intolerantes a lactosa, problemas GI
FERPLEX	Protein succinilato (Fe+++) Contiene 40 mg Fe/vial	30 min antes de comidas	Contiene sorbitol y caseína Ennegrece heces y dientes	Alérgicos a fructosa, ulcerosos, GI, Alérgicos a proteínas de la leche
FERROCUR	Proteinsuccinilato (Fe+++) Contiene 40 mg Fe/vial	30 min antes de comidas	Contiene sorbitol Ennegrece heces y dientes	Alérgicos a fructosa, ulcerosos, GI
LACTOFERRINA	Proteinsuccinilato (Fe+++) Contiene 40 mg Fe/ vial	30 min antes de comidas	Contiene sorbitol y caseína Ennegrece heces y dientes	Alérgicos a fructosa, ulcerosos, GI Alérgicos a la proteína de la leche
PODERTONIC	Ferrocilinato (Fe+++) Contiene 112,6 mg/ sobre	1 h antes de comidas 2 h después de comidas	Contiene sacarosa Ennegrece heces y dientes	Diabéticos, intolerancias por déficit enzimático Ulcerosos y GI
FERO GRADUMET	Sulfato ferroso (Fe++) Contiene 105 mg Fe/comprimido	1 h antes de comidas 2h después de comidas	Contiene rojo cochinilla y aceite de ricino Ennegrece las heces.	Alérgicos al rojo cochinilla y a salicilatos. Asmáticos , ancianos y GI
TARDYFERON	Sulfato ferroso (Fe++) Contiene 80 mg Fe/gragea	1 h antes de comidas 2 h después de comidas	Contiene almidón, sacarosa, amaranto y aceite de ricino. Ennegrece las heces.	Celíacos, asmáticos, alérgicos a salicilatos. Ancianos, ulcerosos y GI
GLUTAFERRO	Ferroglicina sulfato (Fe++) Contiene 30 mg de Fe II/ml de sal	1 h antes de comidas 2 h después de comidas	Uso aceptado en niños lactantes y lactancia Ennegrece heces y dientes	Ancianos, ulcerosos y GI
FERBISOL	Ferroglicina sulfato (Fe++) Contiene 100 mg de Fe II/capsula	1 h antes de comidas 2 h después de comidas	No en menores de 6 años Uso aceptado durante la lactancia	Ancianos, ulcerosos y GI
FERRO SANOL	Ferroglicina sulfato (Fe++) Contiene 100 mg de Fe II/capsula	1 h antes de comidas 2 h después de comidas	No en menores de 6 años Ennegrece heces y dientes	Ancianos, ulcerosos y GI
CROMATOMBIC FE	Lactato ferroso (Fe++) Contiene 37,5 mg de Fe II/vial	1 h antes de comidas 2 h después de comidas	Ennegrece heces y dientes Manipulación compleja	Ancianos, ulcerosos y GI