

CUADRO FARMACOLÓGICO PARA LA DISPENSACIÓN ACTIVA DE ANTIDIABÉTICOS ORALES

	BIGUANIDAS METFORMINA	SULFONILUREAS	METIGLINIDAS	INHIBIDORES A- GLUCOSIDASAS	GLITAZONAS TIAZOLIDINDIONAS
ESPECIALIDADES	DIANBEN METFORMINA	DIABINESE, DAONIL, EUGLUCON, MINODIAB, DIAMICRON, AMARYL, GLURENOR,	NOVONORM, PRANDIN, STARLIX	GLUMIDA, GLUCOBAY, DIASTABOL, PLUMAROL, ACARBOSA	AVANDIA, ACTOS, GLUSIN,
PRINCIPIOS ACTIVOS	Metformina	Clorpropamida, glibenclamida, glipizida, glicazida, glimepirida, glisentida, gliquidona	Nateglinidas, repaglinida	Acarbosa, miglitol	Rosiglitazona, pioglitazona
ACCIÓN	<R a insulina, <lípidos, <peso	>insulina, >peso	>insulina, >peso	<absorción gi de glu	<R a insulina, <lípidos
POSOLOGÍA t 1/2	1-2/día 12 horas	Diversidad s/ fármaco	1,5 - 180 4 horas	150 mg/día	4-30 mg/día
DOSIS MÁXIMA	2.550 mg/día	Diversas	16 - 360	300 mg/día	8-45 mg/día
ADMINISTRACIÓN	Al finalizar la comida	Antes o durante	Justo antes de comer	Al inicio de comidas	No importa comidas
CONTRAINDICADOS	IR, IH, embarazo, lactancia, alergia, MB	IR, embarazo, lactancia, + tiazidas	Embarazo, lactancia	Embarazo, lactancia, GI	IC, H, embarazo, lactancia, contrastes de yodo, IM reciente.
EFFECTOS ADVERSOS	GI, SNC, Hem, acidosis MB, cefaleas,	>glu, GI, SN, Hem, Rush	<glu, GI	GI, <glu, SN, hepatotox	Edema, <TG, >lípidos, >peso
SELECCIÓN	obesos	delgados			postprandrial
INTERACCIONES	Contrastes yodados, cimetidina, ketotifeno, IECA, betabloqueantes	AAS	Gemfibrozilo, trimetoprim	Con enzimas y con carbón activado	

NUEVOS ADO: INCRETINOMIMÉTICOS= ANÁLOGOS DE GLUCAGON Y LOS INHIBIDORES DE DDP-4 (byetta, tesavel, xelevia, galvus,) para combinar.

Elaborado por Manuela Plasencia Cano

Sociedad Española de Farmacia Rural-SEFAR. C/ Villanueva, 11. 28001- MADRID. CIF: G85962124. Asociación

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1, Nº Nacional 595328.

Web: <http://www.sefar.org.es/> E-mail de contacto: hablaconsefar@sefar.org.es